

RECOMENDACIONES ANTE EL AUMENTO DE CASOS DE COVID-19 Y CIRCULACIÓN DE VARIANTES DE INTERÉS DE SARS COV-2

Ante el aumento del número de casos de COVID-19 y SARS CoV-2 registrado durante las últimas semanas en nuestro país, el Ministerio de Salud de la Nación insta a los equipos de salud a fortalecer la vigilancia epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas y promover las medidas de prevención recomendadas tanto para los equipos de salud como en la población general, incluyendo la necesidad de mantener actualizado el esquema de vacunación.

RECOMENDACIÓN REFUERZO VACUNA COVID.

Riesgo alto de COVID-19 grave: Personas de 50 años o mayores, personas gestantes y personas con inmunocompromiso a partir de los 6 meses de vida. Se aplicará una dosis de refuerzo a los seis (6) meses desde la última dosis aplicada y luego continuará con la misma periodicidad (cada 6 meses).

Riesgo intermedio de COVID-19 grave o alta exposición laboral a SARS-CoV-2: Personas menores de 50 años con comorbilidades no inmunosupresoras (enfermedades crónicas, obesidad), personal de salud y personal estratégico. Dosis de refuerzo a los 6 meses desde la última dosis aplicada y luego continuar con una periodicidad anual.

Riesgo bajo de COVID-19 grave: Personas entre 6 meses y 49 años inclusive sin comorbilidades. Dosis de refuerzo a los doce (12) meses de la última dosis aplicada y luego continuar con periodicidad anual.

La vacuna contra COVID-19 se puede aplicar junto con las vacunas del Calendario Nacional.

Actualmente, las vacunas disponibles son Spikevax® bivalente Original/Omicron BA.4/BA.5 (Moderna) para esquema inicial y refuerzos desde los 6 meses de edad y Comirnaty® bivalente Original/Omicron BA.4/BA.5 (Pfizer-BioNTech), indicada para refuerzo a partir de los 12 años.

Es importante destacar que la recomendación de **la dosis de refuerzo** depende del momento de la última dosis aplicada por lo que **es independiente del número de dosis de refuerzos recibidos previamente**.

El intervalo mínimo, entre el esquema primario y la dosis de refuerzo, así como entre refuerzos posteriores es de 4 meses.